





តើត្រូវផ្តល់ថ្នាំគ្រាប់ជាតិស័ង្កសីរបៀបណា ?




១. ប្រុងចាំទឹកដោះម្តាយ ដាក់ចូលស្លាបព្រាបាយ
២. ដាក់ថ្នាំ១ចំហៀង គ្រាប់ចូល
៣. កូរឱ្យថ្នាំឱ្យរលាយអស់
៤. បន្ទាប់មកបញ្ចូល ឱ្យកុមារផឹកតាមសំរួល



ផ្តល់ថ្នាំកន្លះគ្រាប់ ក្នុង១ថ្ងៃ (រយៈពេល ១០ថ្ងៃ)



១. បញ្ចូលថ្នាំ១ គ្រាប់ បើកុមារអាចទំពារបាន
២. ចាក់ទឹកឆ្អឹងឬទឹកអូររំលឹត ឬទឹកដោះម្តាយ២ស្លាបព្រា បាយចូលក្នុងកែវស្អាត
៣. ដាក់ថ្នាំ ១គ្រាប់ ចូលរង់ចាំឬកូរឱ្យ ថ្នាំរលាយអស់
៤. បញ្ចូលកុមារ ផឹកតាមសំរួល



ផ្តល់ថ្នាំ ១គ្រាប់ ក្នុង១ថ្ងៃ (រយៈពេល ១០ថ្ងៃ)

- ☞ បើកុមារក្នុងកំឡុងពេល ៣០ នាទីក្រោយផឹកថ្នាំ ត្រូវអោយកុមារផឹកថ្នាំម្តងទៀត។ បើកុមារនៅតែក្អួត ត្រូវបញ្ឈប់ការផ្តល់ថ្នាំក្នុងពេលនោះ ហើយចាប់ផ្តើមឱ្យក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់។ បើកុមារក្អួតញឹកញាប់ ត្រូវបញ្ជូនកុមារទៅមណ្ឌល សុខភាព។
- ☞ ត្រូវបន្តការផ្តល់ថ្នាំគ្រាប់ជាតិស័ង្កសី ១ថ្ងៃម្តងឱ្យគ្រប់ ១០ថ្ងៃ ទោះបីជាគ្មានឈាមក៏ដោយ។
- ☞ ផឹកថ្នាំគ្រាប់ជាតិស័ង្កសីគ្រប់ ១០ថ្ងៃ អាចកាត់បន្ថយរយៈពេលរាកនិងជួយបន្ថយចំនួនលើកនៃការកើតជំងឺរាកក្នុងរយៈពេល ២-៣ខែបន្ទាប់។